

จดหมายข่าว

“การฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประจำเดือน เมษายน 2560

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

วัคซีนพิษสุนัขบ้า คือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเรบี (Rabies) โดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว ลิง ค้างคาว ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับเชื้อจากการถูกกัดหรือข่วน การฉีดวัคซีนนี้จะช่วยป้องกันผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า โดยผลิตขึ้นมาจากเชื้อไวรัสเรบีที่ตายแล้ว เมื่อเข้าไปในร่างกาย เชื้อจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไวรัสเรบี

ในปัจจุบันวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่

- วัคซีนไข่ไก่ฟักชนิดบริสุทธิ์ (Purified Chick Embryo Cell Vaccine: PCECV) คือวัคซีนที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในไข่ไก่
- วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงบริสุทธิ์ (Purified Vero Cell Rabies Vaccine: PVRV) คือวัคซีนที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อภายในไวรัสเซลล์

- (Vero Cells)
- วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงบริสุทธิ์ชนิดโครมาโทกราฟี (Chromatographically Purified vero cell Rabies Vaccine: CPRV) วัคซีนที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อภายในไวรัสเซลล์ (Vero Cells) และผ่านกรรมวิธีโครมาโทกราฟี เพื่อสกัดออกมาเป็นวัคซีน

การใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

วัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่จะต้องฉีดภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และต้องเข้ารับการฉีดโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งก่อนฉีดจะต้องอ่านเอกสารกำกับยาให้ชัดเจน เพื่อปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำได้ 2 แบบคือ

- ฉีดเพื่อป้องกันก่อนได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ผู้ซึ่งสมควรได้รับวัคซีนนี้ได้แก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปยังบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ที่ทำงานและอยู่ใกล้สัตว์ป่า ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสเชื้อไวรัสดังกล่าว หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อ เช่น บุรุษไปรษณีย์ สัตว์แพทย์ ครูฝึกสอนสัตว์เลี้ยง หรือผู้ดูแลสัตว์
- ฉีดเพื่อป้องกันเมื่อต้องสงสัยว่าอาจได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า แพทย์จะพิจารณาให้รับวัคซีนนี้เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด หรือข่วน ซึ่งจะต้องได้รับวัคซีนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

หากผู้ป่วยมีอาการหรือความผิดปกติที่รุนแรงมากขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เช่น



- มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือ**แสบขา**
- กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าอ่อนแรง
- มีไข้หนาวสั่น
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มีอาการชัก
- มีแผลฟกช้ำ ปวด หรือบวมบริเวณที่ได้รับวัคซีน
- ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและเรื้อรัง
- หายใจถี่ หรือหายใจมีเสียงหวีด
- คอติด หรือมีอาการแขนและขาบวม
- ต่อมนี้เหลืองบวม
- การมองเห็นผิดปกติ



ด้วยความปรารถนาดีจาก
“กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เทศบาลตำบลท่าสาย”